

瘍

醫

大

全

瘍醫大全目錄

卷二十

胸膈臍腹部

甘疽門主論

胸癰門主論

肺癰門主論

膈中疽門主論

井疽門主論

心漏門主論

瘍醫大全

卷二十目錄

一
銅氏秘書

赤膈類傷寒門主論

小兒龜胸門主論

脾發痘門主論

胸前蜂窩發門主論

枯筋箭門主論

乳癰門主論附牙

乳頭陷下門主論

乳頭破裂門主論附牙

乳衄門主論

乳汁自流不禁門主論 附方

乳疔門主論

乳痞門主論 附方

乳巖門主論 附方

乳少門主論 附方

乳汁閉塞脹痛門主方

回乳門主方

斷乳門主方

脫疽門主論

血亂瘡門主論

傳心疽門主論

脇痛門主論 附方

脇疽門主論 附方

內發丹毒門主論

俠熒疽門主論

骨蒸瘡門主論

黃瓜癰門主論

腰帶癰門主論 附方

幽癰門主論

中腕疽門主論

赫癰門主論

小兒臍汁不乾門主論

附方

小兒臍風門主論

臍突門主論

附方

爛臍門主論

臍中出血門主論

臍上疽門主論

臍癰門主論

臍漏門主論

肚皮青黑門主方

肚癰門主論

附方

小腹癰門主論

緩疽門主論

瘍醫大全卷二十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東

全校

男 槐熨用和

胸膈臍腹部

自胸膈起至乳房臍腹脇肋止凡一切癰疽疔毒皆
彙於此部中以便檢閱叅治

甘疽



甘疽門主論


靈樞云甘疽發於膺

膺胸兩傍高起亦謂之臄

色青其狀如穀實

瓜藪常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十日死
死後出膿

心法曰此疽生於乳上肉高聳處屬肺經中府穴之
下無論左右皆由憂思氣結而成



胸發門主論

申斗垣曰胸發發於玉堂

穴在紫宮下一寸 膻中一名

元兒穴在玉堂下

中庭

穴在膻中下 鳩尾

穴在蔽

一寸六分兩乳間

一寸六分

鳩尾

骨之端

言其骨垂下如鳩形故名臆前蔽骨下五分

等穴

人無蔽骨者從岐骨之際下行一寸是也
皆任脉之絡名陰脉之海乃人身之子午也急早

內托防毒歸心傷膜者死 敬立

汪省之曰中庭疽在乳之中央任脉之經

理例

薛立齋曰胸發生於正胸堂去結喉三寸與心窩不

遠乃手足六經交會之所其患最凶喪人性命宜

速治若三四日失治則皮開肉裂甚可畏也若使
長大百不一救宜用牛黃熊膽研細香油調塗四
邊弦上以免開花如痛用乳香沒藥爲末鋪粗紙
內外以青布片捲好蘸清油點著在瘡四圍照之
痛自止矣內服清熱護心祛毒鎮心湯劑若開花
穿穴神仙莫救


肺疽



肺疽門主論

申斗垣曰肺疽卽天火瘡乃任脉之經當胸而生在
紫宮玉堂之穴十日可刺膿水黃白色者可治如
無膿漸大傍攻上硬下虛自破流水不絕咳唾引
痛者死 啟玄

臚中疽



癰疽門主論

王肯堂曰癰疽生心窩上兩乳中間屬任脉經臍
中穴蓋臍中爲氣之海氣所居焉能分布陰陽若
臟腑陰陽不和七情不平則發此證稍遲則潰爛
惡證多者難治

準繩



井疽門主論

靈樞云發於胸名曰井疽其狀大如豆三四日起不治下入腹不治七日死矣

王肯堂曰心窩生疽初起如黃豆肉色不變名曰井疽又名穿心冷癭若冷氣攻心精神恍惚嘔吐冷痰惡聞食臭毒氣內陷腹脹滿者不治若心躁如火肌熱如焚不時盜汗唇焦舌乾黃色渴飲冷水者是正候也


準繩

申斗垣曰井疽又名心漏疽又名穿心毒最爲難治

有經年不愈者乃多食生冷死厭之物惡毒積久
內犯心包絡故外發於心掩也乃心胃兩經受症
治同癰疽法 啟玄

汪省之曰井疽乃任脉之經在鳩尾穴狀如大豆三
四日間若不早治十日必死外發者生內陷者死
理例

心漏



心漏門主論

陳遠公曰有胸間生瘡因不慎酒色致成漏竅生數頭流血久則神形困憊腰痛難伸行同偃僂人以爲心漏也誰知乃腎虛成漏乎夫心腎本相通也心氣必得腎氣以相生腎氣必得心氣以相閉心漏之成成於腎氣之泄也安可不急治腎氣之衰乎然治腎而心氣不閉則補腎無益蓋有出氣而無止氣耳或云漏瘡多成於濕熱今補腎而不閉心竅則漏不愈閉心竅而不去濕熱只治心腎漏

亦不能愈也然漏亦不同漏在他處者可泄其濕
熱在胸間者不可泄濕熱也蓋漏既成於腎虛腎
虛則寒而非熱也腎虛者腎水虛而非邪水盛也
補直陰而邪水自消溫腎寒而濕熱自退耳用溫
腎丹鹿茸二具附子二枚人參青鹽各二兩瓦松
二枝紅棗四兩煮棗搗丸每空心酒下三十丸服
半月腰疼少減服月餘而漏愈矣水鑑

此方奇在鹿茸既能益腎中之水火更能補心中
之缺陷加以附子之辛熱則無經不達引鹿茸直
入心腎以填其空竅青鹽者鹹以軟堅也漏多孔
竅流血必多血得鹽則止也瓦松者消濕熱於無

形心漏卽非漏熱然未可少有留有則孔竅難塞
故兼用之以防其變又恐氣虛不能運化加參以
生氣於心腎之間助茸附之
力通達上下尤易成功也

馮魯瞻曰胸前有一孔常出血水名曰心漏用嫩鹿
茸去毛酥炙附子炮去皮臍鹽花共爲細末棗肉
爲丸每服三十丸空心酒下兼治腎虛腰痛如神
錦囊

赤膈類傷寒門主論

凡胸膈赤腫疼痛頭疼身痛發熱惡寒此名赤膈傷
寒宜荊防敗毒散加瓜蒌子黃連黃芩紫荊皮元
參赤芍升麻白芷如症有表復有裏胸膈赤腫疼
痛者防風通聖散加黃連瓜蒌子紫荊皮如表證
已退大便燥實胸膈腫痛者涼膈解毒加瓜蒌子
枳殼桔梗紫荊皮赤芍又宜稜針刺腫毒出血如
半表半裏胸膈腫痛者柴胡枳桔湯加瓜蒌子紫
荊皮赤芍

小兒龜胸門主論

龜胸者胸高脹滿形如覆掌多因乳母酒麪五辛無度所傷或夏月煩燥熱乳宿乳與兒蓋肺氣最清爲諸臟華蓋水氣泛溢肺爲之浮日久痰滯則生風熱一觸諸辛肺氣昏亂是以唇紅面赤咳嗽喘促溇瀉蒸熱由此而成疳由疳而成龜背矣如藥後而復作傳變目睛直視痰涎壅上或發搐者難治




脾發疽門主論

王肯堂曰脾發疽生心窩下兩傍屬脾經食竇穴無論左右皆生由多食煎燂醉飽入房以致毒聚脾經而成稍遲則潰傷脾膜膿如蟹沫者死服藥而嘔飲食不進者死

準繩

心法曰此疽因過飲辛熱藥酒積火成毒亦生

胸前蜂窩發



胸前蜂窠發門主論

申斗垣曰蜂窠發在胸乳間或左或右或雙發在或

中

穴在膻府下一寸六分陷中

神藏

穴在或中下一寸六分

靈墟

穴在神藏下一寸

寸七分

三穴乃足少陰腎經所主心熱甚急宜內托

踈心火其症心懸若饑饉不能食舌乾咽腫歸心

則死

啟玄

枯筋箭門主論

陳實功曰枯筋箭乃憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣
外發初起如赤豆大枯點微高日久破裂攢出筋
頭蓬鬆枯槁多生胸乳間者是也宜用藥絲線齊
根緊緊七日後其患自落再換珍珠散其疤自收
兼戒口味正宗

乳癰



乳癰門主論

陳遠公曰有乳上生癰先疼後腫尋常發熱變成瘍癰此症男婦皆有之而女人居多蓋女人乳兒之時偶爾貪睡兒以口氣吹之使乳內之氣閉塞不通以至作痛卽以解散藥治之隨手而愈若因循失治而乳癰成矣惟男子則不然乃胃火熾盛不上升於口舌而中壅于乳房乃生此症故乳癰乃陽症也不比他癰有陰有陽治法不必分陰陽但分先後爲虛實耳蓋乳癰初起爲實邪久經潰爛

爲正虛然邪之有餘仍是正之不足于補中散邪
乃萬全之道不必先攻而後補也用和乳湯貝母
花粉
各三錢當歸蒲公英各一兩生甘草一劑乳房通
二錢川山甲一片土炒爲末水煎服
腫消不二劑也此方以貝母花粉消胃中壅痰痰
壅而乳房不通今化其痰則胃火失勢後以公英
山甲解熱毒利其關竅不攻自散恐藥過于迅逐
加歸甘草補正和解正既無傷邪火毒不致變爲
乳巖也 冰鑑

陳實功曰婦人平日不善調養以致胃汁濁而壅滯

爲膿名曰乳癰

正宗

又曰亦有憂鬱傷肝肝氣滯而結腫成癰者宜逍遙散加橘葉散之

又曰亦有暴怒傷肝肝火妄動結腫者橘皮湯散之
馮魯瞻曰婦人之乳男子之腎皆性命之根也人之
氣血周行無間寅時始於手太陰肺經出於雲門
穴穴在乳上丑時歸於足厥陰肝經入於期門穴
穴在乳下出於上入於下肺領氣肝藏血乳正居
於其間也其足陽明之脉自缺盆下於乳又衝脉

者起於氣街並足陽明夾臍上行至胸中而散故乳房屬足陽明胃經乳頭屬足厥陰肝經婦人不知調養有傷衝任且忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行陽明之血熱甚或爲風邪所客則氣壅不散結聚乳間或硬或腫疼痛有核乳汁不出名曰妒乳漸至皮膚焮腫寒熱往來謂之乳癰風多則硬腫色白熱多則焮腫色赤不治則血凝氣爲壅滯而與乳內津液相搏腐化爲膿治之之法凡初起寒熱焮痛卽發表散邪疏肝清

胃速下乳汁導其壅塞則病可愈若不散則最易成膿宜用托裏若潰後肌肉不生膿水清稀宜補脾胃若膿出反痛惡寒發熱宜調榮衛若晡熱炊彈作痛宜補陰血若食少作嘔宜補胃氣切戒清涼解毒反傷脾胃也 錦囊

又曰有因婦人所乳之子膈有滯痰口氣熾熱含乳而睡熱氣吹入乳房凝滯不散遂生結核若初起時忍痛揉軟吮去乳汁即可消散失此不治必成癰腫亦有因小兒斷乳後不能回乳或婦人乳多

嬰兒少飲積滯凝結又或經候不調逆行失道又有邪氣內鬱結成癰腫初起時切勿用涼藥蓋乳本血化不能漏泄遂結實腫乳性清寒又加涼藥則陰爛宜也惟涼藥用之既破之後則佳如初發時宜用南星薑汁敷之可以內消更加草烏一味能破惡血逐塊遇冷卽消遇熱卽潰更加乳香沒藥以定痛內則用瓜蒞十宣散通氣散間服之然年四十已下者治之多瘥以氣血旺故也五十以上慎勿治之多死以天癸絕也不治自能終其天

年若欲加治惟調氣血爲主

又曰若鬱怒肝火熾盛爲腫爲痛者自當疏肝散鬱兼以養血和血則肝陽不强而腫自退若鬱結彌甚血滯不舒更由乳汁壅積潰而成膿則爲乳癰矣氣血大傷尤宜重爲滋補少佐疏肝解毒若專事清解則潰者難膿而膿者難長矣

胡公弼曰婦人乳有十二穰始生乳癰祇患一穰膿血出盡又患一穰逐穰輪流傷至七穰卽傳次乳次乳患遍則危而不救者多矣初起每早服元壽

丹可保餘穰不受傳毒

青囊

又曰憂怒傷肝肝氣滯而結腫者初起必煩渴嘔吐
寒熱交作腫痛疼甚者牛蒡子湯主之厚味飲食
暴怒肝火結腫者橘葉湯主之

又曰男子乳頭屬肝乳房屬腎女子乳頭屬肝乳房
屬胃

又曰不乳兒婦人患乳名曰害乾奶子

陳實功曰乳房屬陽明胃經所司乳頭屬厥陰肝經
所主多血少氣有乳之婦名曰外吹懷孕之婦名

曰內吹 正宗

汪省之曰如懷孕八九個月患內吹乳雖膿出腐脫
肌生必待分娩而後始能收口 理例

申斗垣曰胎氣旺而上冲致陽明乳房作腫名曰內
吹又名裡吹奶 啟玄

馮魯瞻曰乳癰者俗呼曰吹乳吹者風也風熱結泊
於乳房之間血脉凝泣焮痛脹潰稠膿湧出此屬
膽胃熱毒氣血壅滯又名乳癰爲易治用青皮疏
厥陰之滯石膏清陽明之熱甘草節解毒而行汚

濁之血荆防散風而兼助藥達表瓜蒌沒藥青橘
葉皂刺銀花土貝母當歸及酒佐之無非疏肝和
血解毒而已加艾隔蒜灸二三十壯於痛處最效
切忌刀針傷筋潰脉爲害不小

錦囊

澄曰更有寡婦並無兒女吮乳而乳房或腫焮痛者
此爲蒲風呵奶當全乾奶治法

陳白明曰懷孕患乳曰內吹乃胎氣旺而上冲致陽
明乳房作腫宜石膏散清之亦可消散遲則遷延
日久將產出膿乳汁亦從臙竅流出其口難完

精要

心法曰內吹者懷胎六七月胸滿氣上乳房結腫疼
痛若色紅者因熱盛也如色不紅者旣因氣鬱且
兼胎旺也外吹者乳母肝胃氣濁更兼兒吮乳壅
熱鼻孔涼氣襲入乳房與熱乳凝結腫痛令人寒
熱煩躁口渴又有內未懷胎外無哺乳而生腫痛
者係皮肉爲患未傷乳房此肝胃濕熱凝結也

乳癰門主方

鹿角散

治乳癰初起結腫疼痛增寒發熱但未成膿者
鹿角尖三寸用炭火煨稍紅存性研末每服三錢
食後熱酒一茶鍾調服甚者再一服必消或以生
鹿角尖剉細末生酒冲服三錢立消

又方

馬齒莧一把洗淨全皮硝搗爛敷上卽刻止痛如
無鮮者可於端午連根採收亦可

灸乳腫妙方

正宗

治氣惱勞傷或寒熱不調乳內忽生腫痛

用碗一隻內用麤燈草四根十字排勻碗內燈草頭各露寸許再用平山麤紙裁成一寸五分濶紙條用水濕貼蓋碗內燈草上紙與碗口相齊將碗覆於腫乳上留燈草頭在外將艾大圓放碗足底內點火灸之艾盡再添灸至碗口流出水氣內痛覺止方住甚者次日再灸一次必消

錦囊新定消乳癰神效方

馮氏

金銀花 二兩

蒲公英 一兩

甘草節 三錢

沒藥

去油二錢

當歸尾

六錢

水酒各三碗煎一碗食後服搗再煎絞汁服

又方

葛稚川

人牙齒燒存性研極細酥調敷

窠原五物湯

外科集驗

乳癰癰疽發背立止疼痛

瓜蒌

一枚研

皂角刺

燒帶生

沒藥

各五錢

乳香

甘草

各二錢五分

酒三觔煎取二觔時時飲之

元壽丹

張涵谷

乳癰初起卽消已潰可保餘瓣無恙

龜殼

去牆版不用止用龜蓋火煨存性

研細末熱酒調服三錢儘

量飲醉卽愈

芙蓉膏

治乳癰發背癰疽拔根止痛歛口

芙蓉花搗如泥若無花取根用竹刀刮去粗皮只用內嫩白皮搗如泥入蜜少許調勻如未穿卽敷

四圍中留一孔透氣如已潰卽填入瘡口其膿根自然湧出俟膿盡再上乾膿散

乾膿散

凡毒膿汁久出不已者用此摻之乾膿飲口

海螵蛸

天竺黃

飛血丹

炒紫色

輕粉

各二錢

麝香

二厘

分五

眞降香老節

三錢

共乳極細乾摻瘡口不數日膿卽乾矣

乳癰初起

濟生

活鯽魚背脊肉和蒸飯搗如泥敷上卽散

乳癰

穿山甲炒二兩 青皮三兩

研細末用熱酒調服三錢另飲酒儘量被蓋取汗卽消

乳癰初起但未成膿者皆消

用大碗盛醋半碗以白石蛋大一塊燒紅淬醋內二三次以醋熱爲度卽將患乳浸入醋內冷則再燒再淬再浸三次卽消

乳癰爛見心者

猫腹下毛乾鍋內煨存性爲末乾摻或清油調勻
入輕粉少許搽之

乳癰潰爛兩三指大者

芎汁半酒盃牛皮膠一兩切片隔水頓一伏時以
膠老爲度乘熱納入潰處以桑皮紙貼之如內膿
未盡自然脫下仍如法乘熱納入倘粘緊不脫卽
不須又換聽其自落則肉已長足收口矣寶之

神效瓜蒌散

外科集驗

治乳癰乳疽疔勞

川當歸

酒洗去蘆焙切

生甘草

各五錢

滴乳香

去油另研一錢

黃瓜萐

子多者一箇去皮焙爲末如急用以須研爛

明沒藥

去油另研二錢五分

無灰酒三升全藥入銀石器中慢火熬取一升

清汁分爲三服食後服之如妳勞便服此藥杜

絕病根如毒氣已成能化膿爲黃水如毒未成

卽內消甚者再服以退爲度治乳之方甚多獨

此一方神驗萬無一失

消乳癰神方

大當歸

一枝洗去泥

生黃芪

三錢或五錢

蒲公英

四兩

金銀花 四兩

甘草節 五錢

酒水全煎三大碗搯再煎服以一日夜服盡自
消歷試煙驗

乳癰未成卽散已成卽潰立刻止痛神效無比名橘
香散

陳皮 去白淨麝香一分

研細酒調服二錢被蓋出汗

乳癰初起二三日立消天下第一仙方

活鯽魚一尾連頭骨生搗極爛香臘糟一小團再

研勻敷上一日待消小卽取下不消再貼如神

乳癰 周鶴仙方

苦瓜萆

兩箇每箇入酥炙穿山甲一錢人弱者用五分

粉甘草

六錢裝入瓜內

用好酒二觔水二觔全煎至一大碗臨卧熱服
渣搗爛再用酒水各一觔煎服將搗乘熱敷滿
乳上用布捆住蓋被出汗無不立愈不論已破
未破只用一服神效無比

驗方

陳蓮蓬殼一個陰陽瓦焙存性研末無灰酒調服

醉自消以搗敷之自消

澤芡湯

澤蘭葉 一兩 白芡 三錢

水煎冲酒服取汗自消

又方

生半夏一箇研細葱白一寸連鬚搗丸如蓮子大
絲綿包裹左乳塞右鼻孔右乳塞左鼻孔睡自消

又方

兔耳一枝箭

出嶽州

煎酒服自消

又方

鮮蒲公英搗汁冲熱酒服取汗揼加酒糟搗敷乳

上自消

又方

舊芭蕉扇燒存性研末酒調自消

又方

生皂角子七粒熱酒吞下卽消

又方

王峽如

治乳汁不通閉塞並成乳癰

瓜 蕪一箇搗碎 穿山甲炒 歸 尾酒炒

乳 香 沒 藥 甘草節各一錢

酒水各半煎服如成乳癰卽以渣敷乳上用長布裹之經宿自消

又方

蒲公英五錢 當 歸 王不留行

陳 皮 甘草節 生黃耆各二錢

金銀花三錢 防 風 川貝母

白 芷 天花粉各一錢二分 乳 香

沒藥

各五分

加香橙葉十片水煎沖酒儘醉取汗自消

又方

金銀花

蒲公英 各一兩

酒水同煎服以揲乘熱敷腫上卽思睡睡醒自消並治蛇頭疔神效

又方

用葱一握連鬚搗爛作餅置患乳上以磁磬口茶
杯盛熱灰覆葱餅上覺熱氣入裏汗出自消

又方

兩頭尖

即雄老鼠屎

七粒或十三粒研末冲酒服即消

又方

陳皮

去白五錢

甘草一錢

酒水全煎凡痛極不可忍者服之即止

又方

白芥子

一兩炒黃研末

白酒冲服盡量飲自消

又方

海驃蛸細末三錢酒煎儘量飲出汗自消

又方

赤小豆三合用酒研爛去揼溫服留渣敷之自消
又方

生螳螂脚尖陰陽瓦焙研三錢酒調儘量飲醉蓋
被取汗自消

又方

金銀花

當

歸各二錢

蒲公英三錢

乾

葛一錢五分

酒水同煎食後服再以酒助取汗自消

又方

蒲公英

金銀花

鹿荔枝根

洗淨

防風 各三錢

酒水全煎空心服出汗自消

又方

生半夏

乳香

去油各等分

研細左乳吹右鼻孔右乳吹左鼻孔自消

又方

羊角尖刀刮末每服一錢酒調服自消

又方

黃花菜金銀花各等分酒煎服自消

又方

青皮天花粉各五錢酒煎服自消

又方

皂莢刺燒灰海蛤粉各等分

研勻熱酒調服以手揉乳自消此方只治外吹

又方

黃瓜萼一二枚連皮穰子切碎酒煎頻服自消

又方

鮮蒲公英連根帶葉二兩搗爛酒半觔全煎數沸
熱服搯敷腫上蓋睡一時許再用連鬚芩白煎湯
一茶杯催之得微汗自散此方用之鄉村偏僻無
藥之所極妙亦且簡便

又方

山查核研末每服三錢無灰酒調服初起不過一
二服成餅者四五服自消

又方

蒲公英 三棵

金銀花 二兩

酒水全煎熱服取微汗睡醒卽消搯敷患上

又方

螃蜞去足燒灰存性研末每服二錢黃酒調服

又方

半枝蓮

柔細茸草春三月間生田埂上近水邊等
之可得開紅花儼然半邊蓮花四五月草
深難覓此草解熱清火消腫散毒最爲捷
徑宜多多採取

搗汁沖熱酒服搯敷患上神效

乳吹已成

瓜 萎 一箇

明乳香 二錢

酒煎服

香附餅

消乳吹並敷一切癰疽

香 附 一兩

麝 香 二分

研末以蒲公英二兩酒煎濃汁調敷

又方

玉簪花根加鹽少許共搗如泥初起敷上自消已
成敷之除膿完口

又方

生白朮八兩一半用酒研服一半研敷自消

吹乳紅腫

白芷一兩鬱金七錢研勻水調敷

又方

醋半杯頓滾入廣膠四錢熔化加銀硃二錢調敷

乳硬痛

當歸

甘草

沒

藥

去油各
三錢

水煎沖酒熱服

山居婦人吹乳

桑樹蛀屑飯搗成膏敷之

乳吹結核不能消散腫痛者神效並治乳巖

外科集驗

百齒霜

即梳齒上油垢

圓如芡實大黃丹為衣每服一二

圓熱酒吞下如不飲酒白湯吞之不可化開亦不

可令病人知極有奇效

又方 外科集驗

皂角刺

燒帶生

天南星

生半夏

各二兩

白芷

直僵蚕

焙

草烏

各一兩

研細芡汁黃蜜調敷

洗乳疼方

寶氏

牡蠣煨一兩 五倍子 五錢

枯白礬

一分 一錢五

水二碗煎洗

乳硬作痛

嫩桑葉左採者研細米飲調攤紙上貼之

吹乳

好醋半杯熬滾入牛皮膠五錢熬化敷上自消

吹乳

瑞香花

二十一朵如無用葉二十一片

全陳竈糖搗敷自消

乳吹

明礬研細一歲一厘用雞蛋一箇開一孔將礬裝入蛋內飯上蒸熟去殼將蛋分作小塊無灰酒吞下自消

乳吹

鴨蛋一箇去殼全燒酒攪勻蒸熟食之自消

又方

韭菜地上蚯蚓糞

二錢

菰子

一錢

研細醋調敷上乾則易之三次未有不愈者

又方

兩頭尖的老鼠糞十三粒全葱白搗爛熱黃酒冲服蓋煖出汗卽消已成膿將破者不效

驗方

小青皮

一觔醋浸
三次晒燥

磨細末水法爲丸每服三錢木瓜酒送下自消

驗方

馬桶垢陰陽瓦煨研細末蜜丸桐子大每服一錢

木瓜酒送下雖多年乳核服半觔亦消

又方

葫蘆巴焙研每服三錢木瓜酒調卽消

驗方

大樺皮

一兩切片瓦上焙存性

研細作一服用皂莢子七粒木瓜酒煎一杯調

服自消

敷方

鮮水仙花根不拘多少全馬桶垢搗爛敷卽消

消乳吹

程崙友

皂角子七粒微焙研碎冲酒儘量飲醉出汗卽消

消內吹乳

鯨魚鰾

係雜貨店賣者其形兩頭尖切去尖

用水煨爛搗化攤青布上貼之

乳瘡腫痛

芝蔴炒焦研細燈盞油調敷

又方

野茄根搗汁冲調服

乳癰 劉涓子

大黃

伏龍肝 各二錢

小鯽魚

一尾連鱗
腸搗如泥

醋調敷定痛消腫

患乳立消法

一切乳症初起之時先用連根青菜煎水洗乳再將蒸酥店內饅頭茶鍾大一塊置碗中隔水燉熟敷於浴過乳上再用糯米一合不用淘鍋內炒黃研細用無灰酒冲入與服被蓋取汗無論輕重立刻即消

又方

鮑魚肚子瓦上炙脆研細冲無灰酒調服卽消

又方

鹿角尖磨汁敷之乳吹妬乳腫痛欲作膿者自消

乳頭陷下門主方

兩乳頭陷頂

黃

芪

蜜炙
三錢

當歸身

葛根

升麻

黃栢

連翹

各二錢

牛蒡子

研

炙甘草

各一錢

上肉桂

五分

水二鍾酒半鍾煎一鍾食後服

乳頭破裂門主論

心法曰乳頭屬足厥陰肝經如暴怒或抑鬱肝經怒
火不能施洩是以乳頭破裂痛如刀刺或楷之出
血或流粘水或結黃脂治當以加味逍遙散主之

乳頭破裂門主方

驗方

取秋後冷露茄子裂開者陰乾燒存性研細水調敷

又方

臘脂蛤粉研細敷之

乳衄門主論

婦女乳房並不堅腫結核惟乳竅常流鮮血此名乳
衄乃屬憂思過度肝脾受傷肝不藏血脾不統血
肝火亢盛血失統藏所以成衄也治當平肝散鬱
養血扶脾爲主

澄論

乳汁自流不禁門主論

馮魯瞻曰其有乳汁自出者若胃氣虛而不能飲攝
津液者宜補胃氣以飲之若氣血大虛氣不衛外
血不榮裡而爲妄泄者宜調補榮衛以止之若未
產而乳自出者謂之乳泣生子多不育若產婦勞
役乳汁湧下此陽氣虛而厥也獨參湯主之

錦囊

乳汁自流不禁門主方

十全大補湯

人參

於白朮

甘草炙

白茯苓

當歸

白芍藥

川芎

熟地黃

肉桂


黃

芪

蜜炙

姜棗爲引煎服

乳疔



乳疔門主論

申斗垣曰有養螟蛉之子爲無乳強與吮之久而成
瘡經年不愈或腐去半截似破蓮蓬樣苦楚難忍
肉中敗肉不去好肉不生乃陽明胃中濕熱而成
名曰乳疔

敬立

凡初生女孩必須於月子內大人以手擠其兩乳使
乳頭長出若不知此長大其女必是一對瞎奶生
育之後乳頭微露大半藏在乳房之內小兒吮乳
每每吮破乳頭化去一半疼痛難忍若畏痛不與

小兒吮食必腫脹成乳癰矣務令產婦忍痛令兒
吮之外搽玉紅膏珍珠散自愈澄曾看一小兒初
生吐乳血膜與乳相間細詢產婦始知產婦是瞎
奶被小兒吮破潰爛所以小兒吐出之物係乳中
吮出之血膜也只治產婦之乳小兒不藥而愈自識

乳痞



乳痞門主論

陳遠公曰有左乳內忽大如桃又不疼色亦不赤身發熱體漸瘦損人以爲痰氣鬱結也誰知肝氣不舒乎夫乳屬陽明乳腫宜責陽明矣而余獨謂之肝不起世人之疑乎夫陽明胃土最畏肝木肝氣亦不舒矣蓋胃見木之鬱惟恐來剋畏首畏尾伏而不揚乳又近兩脇兩脇肝之位也與肝相遠尙退縮不敢舒今與肝爲鄰亦何敢吐氣哉氣不舒而腫滿之形成氣不敢舒而畏懼之色現不疼不

赤正見其畏懼也治法不必治胃但治肝而腫自

消矣用加味逍遙散

柴胡二錢白芍五錢陳皮五分當歸瓜蒌半夏白朮茯苓

各三錢人參甘草川芎各一錢水煎服

十劑內消矣去瓜蒌又十劑

不再發矣此方解肝之滯肝解而胃氣不解而自舒益以瓜蒌半夏治胸中積痰痰去腫尤易消也

米鑑

陳實功曰乳癖乃乳中結核形如丸卵或墜重作痛或不痛皮色不變其核隨喜怒消長多由思慮傷脾惱怒傷肝鬱結而成也

寶漢卿曰奶癰是十五六歲女子經脉將行或一月兩次或過月不行多生寡薄形體虛弱乳上只有一核可治若串成三四個難治宜調經開鬱治之多用夏枯草

又曰乳癖乃五六十歲老人多生此疾不成膿不可用涼藥敷服逼令毒入臟腑則危

馮魯瞻曰奶栗卽乳栗又名乳癖破者少有生須用參芪歸芍大補兼解毒外以丁香末敷之

錦囊

申斗垣曰如婦人年近五十以外氣血衰敗當時鬱

悶乳中結核天陰作痛名曰乳核久之一年半載
破而膿水淋漓日久不愈名曰乳漏

啟玄

岐天師曰男子乳房忽然壅腫如婦人之狀捫之疼
痛欲死經年累月不效者乃陽明之毒氣結於乳
房之間也然此毒非瘡毒乃痰毒也若瘡毒何能
經久必然外潰今經年累月壅腫如故非痰毒而
何法當消其痰通其瘀自然奏功如响矣以化聖
通滯湯主之此方妙在金銀花與蒲公英直入陽
明之經又得清痰通滯之藥爲佐附子引經單刀

直入無堅不破又何患痰結之不消或疑附子大
熱諸痛皆屬於火似不可用殊不知非附子不能
入於至堅之內況又有梔子芍藥之酸寒雖附子
大熱亦解其性之烈矣又何疑於過熱哉

秘錄

乳痞門主方

軍門立效散

甘草節

半寸長
九段

川

椒

三十粒

天花粉

五錢

皂角刺

三錢

酒水全煎臨服入去油乳香末一錢冲服

又方

生麻黃

八分

陳香櫟

一枚

甘草

天花粉

各八錢

瓜

蘘

一枚

金錢花

六錢

黃芩

三錢

棉花核

黑色者
五錢

生酒煎服出汗

化聖通滯湯

岐天師

金銀花

蒲公英

各一兩

天花粉

白芥子

各五錢

白芍藥

通草

山梔仁

炒

白茯苓

各三錢

柴胡 二錢

熟附子

木通

各一錢

水煎服

消多年乳核

煤炭研細生蜜和丸棗莖大每服五十丸蒲公英

煎湯下

消遠年近日乳核乳痞

人中白

兩 煅四

雄鼠糞

九十粒

研細米湯爲丸每服一錢無灰酒下以消爲度

孔巖



乳巖門主論

陳遠公曰有生乳癰已經收口因不慎色以至復爛變成乳巖現出無數小瘡口如管如孔如蜂窩狀肉向外生經年累月不愈服敗毒之劑身益狼狽瘡口更腐爛人以爲毒深結于乳房也誰知氣血大虧乎凡人乳房內內外長而筋束于乳頭故傷乳卽傷筋也此處生癰原宜急散遲恐有筋弛難長之患况又泄精損傷元氣安得不變出非常乎當失精後卽大用補精填髓之藥尚不至如此之

橫今既陰虛而成巖又因巖而敗毒不亦益虛其

虛乎治法必大補氣血以生其精不必泄毒以其

無毒可泄耳用化巖湯

人參黃芪忍冬藤當歸各一兩白朮二兩茜根白芥

子各二錢茯苓三錢水煎服

二劑生肉又二劑膿盡疼止又二

劑漏管重長又二劑全愈再二劑不再發也此方

全補氣血不去敗毒雖忍冬乃消毒之味其性亦

補况入于補藥亦純于補矣惟是失精以變巖似

宜補精今止補氣血何也蓋精不可速生而功又

緩不若大補氣血反易生精且乳房屬陽明既生

乳巖而陽明必無多氣多血矣今補氣血則陽明
經旺自生精液以灌乳房又何必生精以牽掣參
芪之功乎所以不用填精之味也

朱鑑

陳實功曰乳巖乃憂鬱傷肝思慮傷脾積想在心所
願不得志者以致經絡痞澁聚結成核初如豆大
漸若棋子半年一年三載五載不疼不癢漸長漸
大始生疼痛痛則無解日後腫如堆栗或如覆碗
紫色氣穢漸漸潰爛深者如巖穴凸者如泛蓮疼
痛連心出血則臭其時五臟俱衰四大不救名曰

乳巖凡犯此者百人百死如能清心靜養無望無
碍不必勉治尚可苟延當以益氣養榮湯主之宗正

又曰凡中年無夫之婦得此更易於死

又曰男子患此名曰乳節與婦女微異女損肝胃男
損肝腎蓋怒火房慾過度由此肝虛血燥腎虛精
怯氣脈不得上行肝經無以榮養遂結腫痛

又曰治當入珍湯加山梔丹皮口乾作渴宜加減入
味丸腎氣丸已潰十全大補湯則易於生肌完口
也

汪省之曰乳巖四十以下者可治五十以下者不可
治治之則死不治反得終天年

理例

馮魯瞻曰婦人有憂怒抑鬱朝夕積累脾氣消阻肝
氣橫逆氣血虧損筋失榮養鬱滯於痰結成隱核
不赤不痛積之漸發數年漸大內潰深爛名曰乳
巖以其瘡形似巖穴也慎不可治此乃七情所傷
肝經血氣枯槁之證治法熅痛寒熱初起卽發表
散邪踈肝之中兼以補養氣血之藥如益氣養榮
湯加味逍遙散之類以風藥從其性氣藥行其滯

參芪歸芍補氣血烏藥木通疎積利壅柴防蘇葉
表散白芷腐膿通榮衛肉桂行血和脉輕者多服
自愈重者尚可苟延若以清涼行氣破血是速其
亡也

錦囊

賈漢卿曰女子已嫁未嫁俱生此候乃陰極陽衰虛
陽與血相積無陽積安能散故此血滲入心經而
成此疾也若未破可治已破卽難治

胡公弼曰乳巖乃性情每多疑忌或不得志於翁姑
或不得意於夫子失於調理忿怒所釀憂鬱所積

厚味釀成以致厥陰之氣不行陽明之血騰沸孔
竅不通結成堅核形如棋子或五七年不發有十
餘年不發者或因歲運流行或因大怒觸動一發
起爛開如翻花石榴者名曰乳粟凡三十歲內血
氣旺者可治四十以外氣血衰敗者難治

青囊

乳巖門主方

內消乳巖乳癖奇方

將壁上活壁蟾用針扞住乘活以竹紙包如小毬
食後白湯吞下每日服一次不過數日乳內卽癢
如蟾蛛走狀其核漸消

又方

生蠟殼砂鍋內炒脆磨極細末熱酒調服二錢或
打糊爲丸每服三錢酒下不可間斷消盡爲止
乳吹乳痞乳巖並一切無名大毒

黃牛大角內嫩角

火煨存性一兩鹿

角

火焙黃色八錢

枯白礬

三錢

和研極細末熱酒調服三錢

乳中有小塊不消不痛不癢卽名乳巖宜早治至六七年後潰爛不救

錢青榆

川貝母

連翹

瓜蒌仁

當歸

炙甘草

各二錢

柴胡

金銀花

白芨

何首烏

白芷

蒲公英

半夏

各一錢五分

川黃連

酒炒

漏

蘆

各一錢

金橘葉

四十片

半枝蓮

搗碎二兩

先將夏枯草半觔和酒水五碗煎至三碗去渣

入前藥全煎就一大碗加去油乳香沒藥細末

各七分不拘時服外用五倍子焙乾爲末醋調

敷

消乳巖丸方

錢青楡

夏枯草

蒲公英

各四兩

金銀花

漏

蘆

各二兩

山茨菰

雄鼠糞

兩頭尖

川貝母 去心

連翹

金橘葉

白芷

甘菊花

沒藥 去油

瓜蒌仁

乳香 去油

茜草根

甘草

廣陳皮

紫花地丁 各一兩五錢

右為細末煉蜜為丸每早晚食後送下二三錢

戒氣惱一方去瓜蒌仁加天花粉桔梗廣膠用

夏枯草熬膏為丸

乳巖初起 錢青榆

青皮

甘草 各等分

共研細末每服二錢用人參湯入生姜汁調細
細呷之一日夜五六次至消乃已神驗年壯者
不必用人參

乳少門主論

馮魯瞻曰乳汁不行有二有氣血盛而壅閉不行有血氣虛而燥澁不行虛者補之如十全八珍之類是也盛者疏之如麥門冬瓜蓼仁葵子猪胰木通漏蘆猪蹄之類是也

錦囊

產婦衝任血旺脾胃氣壯飲食調勻則乳足而濃以生化之源旺也若脾胃氣弱飲食少進衝任素虧則乳少而薄所乳之子亦怯弱而多病其乳以濃白光彩入盞中上面瑩然如玉爲上黃色清薄爲

下不可哺兒乳母宜擇肥瘦適中無病經調善食者佳太肥則多痰太瘦則多火兒飲其乳亦復如是如一兒昏睡竟日不醒舉家驚惶求醫投藥罔效一高醫診之曰此兒中酒得母乳母曾痛飲乎詢之果然停藥而醒可見利害相關明矣然李時珍曰人乳無定性隨飲食性氣而變故飲食調攝乳母不可不慎也

乳少門主方

通脉湯

治乳少或無乳

生黃芪 一兩

當歸

白芷

各五錢

七孔猪蹄一對煮湯吹去浮油煎藥一大碗服之覆面睡卽有乳或未效再一服無不通矣

如新產無乳者不用猪蹄只用酒水各一半煎服體壯者加好紅花三五分以消惡露

乳少

紅荳煮熟連湯喫乳如湧泉

下乳天漿飲

當歸

白芍藥

川芎

麥門冬

通草

穿山甲炒

漏蘆

天花粉

甘草

白茯苓

熟地

王不留行各一錢

白水煎

又方

通草煨猪前蹄連湯食之

又方

穿山甲

王不留行

各等分

研細末熱酒調服三錢

催乳

穿山甲

煨赤色五錢

陳

皮

酒製三錢

研細末分三服米泔水調下一晝夜服完

產後乳脉不行身體壯熱宜玉露散

良方

桔梗

川芎

白芷

赤芍

人參

赤茯苓

當歸

甘草

水煎服

又方

萵苣子糯米各一半細研水一碗攪勻入甘草末
一錢煎頻頻呷服

催乳

當歸

生黃芪

通草

各二錢

木通

一錢

穿山甲

炒研

瞿麥

麥

各一錢五分

王不留行

一錢二分

雄猪七星蹄酒煮連湯飲

產後無乳

穿山甲

七片炒研

王不留行

三錢

健猪蹄

七星者一隻

同煮汁飲之其乳如泉

乳少

雄猪外腎一具陰陽瓦焙存性研末無灰酒冲服

乳汁必多

乳汁清稀

產婦初生三日用炭灰少許和粥內食之乳汁自

湯醫大全

卷二十

乳少方

李

顧氏秘書

稠

下乳

萬莖五根煎湯服

下乳

穿山甲

五錢燒存性

研細末酒調服

乳汁閉塞脹痛門主方

驗法

用有嘴茶壺內貯滾湯半壺將腫乳塞住壺口使壺中熱氣薰乳再令一人口含壺嘴吸之其竅卽通候水溫看水面所浮皆乳卽其驗也

又法

用貓鬚子向乳竅內通之並不痛拔出貓鬚子乳汁自通

又法

用大兒頻吮自通

又法

穀樹葉全糟鹽煨熟縛乳上自通

回乳門主方

薛立齋曰婦人氣血方盛乳房作脹或斷乳脹痛牽引胸脇服之自消

麥

芽

炒三兩

熱水煎服立消

麥芽取其消散精華以絕乳之源也麥芽耗散之力可見故本草謂其能消腎也

回乳四物湯

產婦無兒食乳以致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

熟地

當歸

白芍藥

川

芎

各二錢

大麥芽

二兩炒爲粗末

水二鍾煎八分食遠服用裹脚束繫兩乳以手揉按其腫自然消散甚者再用一服

又方

浮小麥煎濃汁服之自消

斷乳門主方

畫眉膏

斷小兒乳

梔

子

三個燒存性

雄

黃

輕

粉


辰

砂

各少許

爲末香油調勻俟兒睡着濃沫兩眉醒來自不思乳未效再用

腕疽




腕疽門主論

申斗垣曰腕疽乃足三陰三陽之所發於腋下近脇
乃手厥陰心胞絡經多血少氣天池穴初起脇肋
下及兩腿足生赤腫癢二十五日不潰者死九日
刺膿赤者可治如內靨週圍赤乾瘡口內見脂膜
黑者不治此症多因打撲而生

敬立

血亂瘡




血亂瘡門主論

申斗垣曰血亂瘡乃足少陽膽經多氣少血生於淵
腋脇肋傍赤色或有頭無頭如肥皂核大在肉中
如針刺痛忽長大至胸兼足厥陰肝經多血少氣
發於期門名曰腋癰女人患此走諸處二三年變
名結癰三五年出黑水死

啟玄

傳心疽



傳心疽門主論

申斗垣曰傳心疽生於脇下京門帶脉二穴之次乃
足少陽膽經多氣少血痛癢徹心如針刺之痛漸
潰至臍者死

敬立

脇痛門主論

朱丹溪曰兩脇走痛是痰實者可用控涎丹 左脇
痛爲肝經受邪宜柴胡踈肝湯 右脇痛爲肝經
移病於肺宜推氣散 食積痛凡痛有一條扛起
者是也宜消積 氣弱人脇痛脉細緊而弦多從
勞役怒氣得者八物湯加木香青皮 肥白人氣
虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣加柴胡木香青
皮調氣 瘦人發寒熱脇痛多怒者必有瘀血宜
桃仁紅花柴胡青皮大黃滑石 去滯氣必用青

皮乃肝膽二經之藥若二經血不足者先當補血
少如青皮 痰飲停伏脇痛宜導痰湯 脇下痛
而大便秘結者木香檳榔丸 虛寒脇痛者必用
辛溫補劑加調氣藥

解痛以琥珀膏貼之或白芥子水研敷之或吳茱萸
醋研敷之韭菜炒熨亦可

澄曰人有房勞內傷脇下一點痛者名乾脇痛難愈
當大補氣血以養肝大滋腎水以補母

又曰左脇痛胃脘痛二症婦人多有之以其憂思忿

怒之氣素蓄於中發則上衝被濕痰死血阻滯其氣而不得條達故清陽不升濁陰不降肝木之邪得以乘機侵侮而爲病也故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱爲主破血散火兼之諺云香附縮砂婦人之至寶山藥薏苡蓉男子之佳珍此之謂也

脇痛門主方

脇痛 秘方

小 茴 一兩

枳

殼 五錢 麩炒

研末每服二錢鹽湯調服

脇痛紅及半身甚發水泡者 醫旨緒餘

大瓜蒌

一個重一二兩連皮搗爛 粉甘草 二錢

紅

花 五分

一劑而愈真神方也



脇疽門主論

靈樞云發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也多之
其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆治之剉
陵薤草根各一升甲乙經剉陵草赤松根各一升以水一斗六升
煮之竭爲取三升卽強飲厚衣坐於釜上令汗至
足已

王肯堂曰脇疽屬手厥陰心包絡足厥陰肝火熱毒
怒氣相併而作宜速治不然潰爛不斂多致危準繩
陳實功曰脇癰多從鬱怒肝火而發虛怯人多有之

肥胖內實者無此證初起宜梔子清肝湯解鬱瀉
火已成四妙湯加香附青皮膿成者卽針之勿傷
內膜潰後八珍湯加山萸肉牡丹皮澤瀉兼滋腎
水若虛勞而得者破流臭敗稀膿補托不應者俱
死

正宗

汪省之曰脇癰卽穿脇癰左爲癰右爲疽乃風濕入
於骨間日久不散漸覺皮麻骨痛發於腰脇氣虛
胃弱之人切不可過與補陽之藥恐內受熱劑則
虛熱愈盛盛則透傷內膜切宜慎之

理例

又曰昔一人脇下生癰後成漏瘡狀如牛眼膿血不止治法以鹽少許納牛耳中然後取牛耳中垢敷漏上數次卽瘥如不用鹽牛耳不瘥垢亦難取故取垢必需鹽也

胡公弼曰人之兩脇乃足厥陰肝經氣分出入之道路一有阻滯不得疏通鬱而爲痛故血亦因之而凝聚矣是以脇之上下發毒皆屬肝經

青囊

王肯堂曰蜂窩兩脇雙發疽或發於左脇或發於右脇或兩脇雙發乃足厥陰肝經期門及章門穴是

經多血少氣如上至淵腋輒筋二穴屬足少陽膽
經多氣少血因氣虛而得不可用熱劑恐傷骨膜
準繩

馮魯瞻曰脇癰者乃足厥陰少陽之經相火之司也
苟或肝膽之氣不平則風火內搏榮逆血熱而鬱
聚爲膿矣 錦囊

心法曰脇疽生於賴肋肋有硬骨者爲肋肋下軟肉
處爲季脇乃肝膽怒火凝結而成多生體虛之人
初如梅李漸長如盃如盆

脇疽門主方

脇癰

地榆

金銀花錢各五

川貝母

當歸

錢各二

穿山甲炮

赤芍錢各三

皂角刺

連翹

白芷錢各一錢五分

甘草節

錢一

夏枯草一兩

先煎入後藥

鼠粘子

錢五分

紫花地丁一兩

煎濾汁再入

鮮菊花根一兩搗汁和服



內發丹毒門主論


王肯堂曰內發丹毒脇下至腰膀間腫痛赤色如霞
治之稍緩毒攻於內嘔噦昏迷胃腹膜脹者死二
便不通遍身青紫者死急砭出惡血服防風通聖
散去白朮甘草紫金丹勝金丹汗之服汗劑得汗
則生無汗則死嘔吐不食譫語者死

準繩

心法曰內發丹毒由肝脾二經熱極生風所致生於
肋骨延及腰膀色赤如霞遊走如雲痛如火燎急
向紅腫周圍砭出紫黑血以瘦牛肉或羊肉片貼

之其毒卽可減去一半若嘔噦昏潰胸腹臍脹偏身青紫者則爲毒氣內攻屬逆

侯熒疽



俠熒疽門主論

鬼遺方云俠熒疽腫起發肋及而肩肘頭二十日不
穴死九日可刺發赤白相間膿多可治赤白全無
者不治

又云兩肋起疽名爲發肋初腫盛至十數日不穴攻
卽腫大如杯椀高如鋤背痛徹內腸絞刺左邊患
應右邊痛右邊患應左邊痛惟有此處多是內毒
却入攻而死者多人有斯患急以針刺出膿血則
免內攻傷內矣

心法曰肋疽卽俠熒疽生於肋條骨間由肝火鬱怒
結聚而成初如梅李漸大如盃色紫焮痛連及肩
肘患在左痛牽右肋患在右痛牽左肋二十一日
得稠膿爲順屆期潰出清水者逆

骨美瘡



骨蒸瘡門主論

申斗垣曰骨蒸瘡乃足太陽膀胱經多血少氣生於
神堂二穴乃膈關膈俞穴初發作癢不可忍如燎
漿水炮抓破內見骨過十日如遍身作癢不可治
也 啟玄

黃爪癰



黃爪癰門主論

申斗垣曰黃爪癰生脇前長尺餘高起二寸上頭小者謂之逆毒難治下頭小者謂之順毒可治 啟玄

腰帶癰



腰帶癰門主論

汪省之曰腰帶癰生於脇下近腹束帶之處乃風熱留滯膀胱不能滲利壅於肌表而成也

理例

竇漢卿曰火腰帶毒乃心肝二經熱毒流滯於膀胱不行壅於皮膚此風毒也宜清肝爲主忌外敷藥

全書

薛立齋曰火腰帶生繫帶之處初起如桃漸漸紅腫宜用斷毒截腰法敷之否則漸生五六小毒沿腰如索纏繞先赤腫後潰爛寒熱交作疼痛難經其

色紫惡

揚醫大全

卷二十

腰帶癰

全

顧氏秘書

腰帶癰門主方

斷毒截腰法

白 芨

雄

黃

兩各一

研細末雞蛋清調敷四圍六七重乾則易之敷
五六日不再流則妙

幽癰門主論

心法曰幽癰生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛
形如鶩卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味
憂思氣結腸胃不通火鬱成毒自內而外發也

中脘疽門主論

心法曰中脘疽一名胃疽發於心胸之下臍上四寸
屬任脉經中脘穴隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮
色無紅無熱由過食炙燂以致胃腑火毒而成人
迎脉盛是毒氣攻裏作嘔不食咳吐膿痰者逆

赫癰門主論

心法曰赫癰由七情鬱火凝結而成生臍上三寸屬
任脉經建里穴初如粟米瘡痛相兼其腫迅速寒熱
往來甚則嘔噦牽引臍痛初腫微紅頂尖根束漸
透赤色時痛時止十四朝得膿爲吉

小兒臍汁不乾門主論

馮魯瞻曰夫臍爲根本風濕防護須嚴一有所失則臍腫不乾久而作搐入於經絡卽成風癇並撮口臍風皆爲惡候錦囊

又曰若臍中不乾常出青黃水者此必初生有傷六腑耳宜藥摻之但此時僅如血塊不可用冰麝之膏貼之並忌大寒大熱之劑蓋肌肉未堅臟腑柔脆難以抵當耳

臍汁不乾門主方

驗方

雷公

車前子炒焦爲細末敷之卽乾

又方

錦囊

大紅羊絨燒灰爲末單敷

又方

啟玄

草紙灰加枯礬研細摻之用紙包裹勿令尿濕

又方

千金

亂髮燒灰敷之

又方

黃栢末敷之

又方 千金

枯礬 五錢

龍骨

黃

丹

各一錢

麝香 少許

研細敷之

臍內潰爛出水不止垂危者

張綱如屢驗方

赤石脂研末敷上立愈

又方

白礬煨

白龍骨煨各等分

研細摻上

又方

棉花子煨灰傳之

又方

明礬枯礬各等分研傳

秘方

海螵蛸研細末乾摻

小兒臍風門主論

駱潛庵曰兒生七日之內肚脹腹硬臍圍浮腫口撮
眉攢牙關不開名曰臍風撮口症蓋因臍帶剪短
或包縛不緊以致水濕浸臍客風乘虛而入傳之
於心蘊蓄其邪復傳脾絡舌強唇青手足微搐喉
中痰響是其候也服延壽丹少許卽愈如神脫氣
冷者不治

又曰口撮吐沫腹硬頭偏搐掣手撚拳臍翻哭無聲
其源因剪臍受風小肚有一筋直上臍來此筋到

臍無救法臍翻者不治若筋未到臍急須用燈火
攔頭燂百會穴三下臍門上燂七下大指燂四下
湧泉燂七下如能攔住直筋不到臍則可救如臍

未翻在神門燂一下

推拿
秘書

臍突門主論

馮魯瞻曰凡小兒落胎之時視其臍軟者無臍風也如臍硬直者定有臍風須看上膠如有白泡點子須用銀針輕輕拭破若有血出者可愈然最危候十難一二能過一臘方愈尤宜察色觀容不可鹵莽假如額赤知爲心熱鼻紅知爲肺熱左腮青知爲肝有餘右腮白知爲脾不足頰白知爲腎虛錦囊又曰熱在胸膛伸引弩氣亦令臍腫

雷公曰小兒肚臍突出半寸此氣旺不收也若不急

安之往往變爲角弓反張

臍突門主方

二豆散 錦囊

治臍突腫

天南星 去皮

白 礞

赤小豆

淡豆豉 各一錢

研末用芭蕉自然汁調敷臍四傍得小便自下

即愈

又方 雷公

白茯苓

車前子 各一錢 陳 皮

通

草

各三分

甘

草

二分

水煎灌之一劑卽安

臍腫

先用荊芥煎湯洗之隨以蔥葉火上炙過放地上
出火氣以指甲刮薄搭放腫處次日卽消

又方

普救

枯

礬

黃

栢

研摻臍上

爛臍門主論

臍乃腎經部位濕熱積過腎經故臍中作爛也亦由
酒醉入房所致

爛臍門主方

龍骨散 錦囊

龍骨 煨

黃連 各一錢

白礬 煨

輕粉 各五分

研末乾摻臍中

臍中生瘡

東壁土敷

臍中出血門主論

臍中出血乃腎火外越也以六味地黃加骨碎補一錢飲之卽愈六味湯滋其水則火自息焰矣骨碎補功能止竅補骨中之漏故加入相宜耳

秘錄



臍上疽門主論

王肯堂曰臍上疽臍上寸許此名衝疽又名中發疽
一名壅腎瘡由心火熾盛流入腎經所致腫高膿
稠色赤可治若平塌黑色膨脹惡心膿水清稀內
腎疼痛渴甚瀉利無度譫語直視者死潰久不斂
者死凡此危證只是虛耳如能大補不死也

準繩


心法曰衝疽生於任脉臍上二寸

下腕穴

色赤黃腫應

在二十一日潰後膿稠受補者順若平塌紫黑膿
水清稀七惡證見者逆

臍癰



臍癰門主論

王肯堂曰臍癰當臍生由心經積熱流於大小腸二經所致臍爲任脉神闕穴禁針之所早消散之免使見膿爲上

準繩

寶漢卿曰臍癰生於臍中因食冷物油膩之物積聚於氣海之間聚結成癰若不速治卽內潰臍內出膿四圍堅硬或出紫血水者卽難治也無此則生宜多服蠟礬丸

胡公弼曰臍癰乃心經受證流於小腸經毒發於臍

甚至臍中出糞

青囊

心法曰臍癰禁針腫大如瓜高突若鈴無紅無熱宜
隔蒜灸之潰後得稠膿者吉時出污水臭穢者逆

臍漏門主論

申斗垣曰一老人年將六十妻少而不自悟得漏臍瘡年半臭不可近百治不效自分必死其老母哭拜求余且曰君能存吾子以繼香烟則母子沒齒不忘大德余以補劑治之外以艾灸臍上次日則不臭矣余更以膏藥貼之後用生肌散填滿臍口又以補中益氣湯半月而安又有一老翁年七十有五因氣惱忽患臍漏三月餘自分必死余照前治之不半月而愈後至八十三歲而卒噫神哉方

張醫大全

乎 敬立

肚皮青黑門主方

肚皮忽然青黑不急治須臾卽死

胡粉酒調敷之

肚癰



肚癰門主論

汪省之曰肚癰乃手陽明大腸手太陽小腸二經受
證熱結之毒發出於表壅聚成癰也

理例

竇漢卿曰肚癰乃脾經之毒因食煎燂油膩酒醉太
過入房以致毒不流通聚成此癰或生於內或生
於外若不速治潰透脾膜則死

全書

心法曰腹皮癰生於腹皮裏膜外無論左右隱痛日
久後發癰腫於皮外右關脉見沉數而腹痛甚者
是其候也由膏粱火鬱而成不可過服剋伐之藥

若希圖消散過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂立
見危亡矣

肚癰門主方

肚癰神效方

石楠樹嫩紅葉搗汁一茶鍾冲酒緩緩服之搗敷
癰上縛之五服全愈



小腹癰門主論

王肯堂曰小腹癰臍下一寸五分爲氣海二寸爲丹田三寸爲關元皆屬任脉由七情不和所致若潰而低陷膿水清稀或潰爛久不斂者死

準繩

見遺方云小腹疽又名衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日悄悄五日變色可刺不刺及導引出膿毒不治五十餘日死

陳遠公曰有生癰小腹間者必無陽症以地屬陰部位也陰生陰毒似乎至重然純陰無陽一用陽藥

立可成功無奈世人一見肚腹生癰多用陰藥消
毒反成不救爲可憫也然余所謂陽藥者非散火
祛風之藥乃補氣溫火之味耳蓋陰成陰毒乃寒
虛之故寒因虛而不行毒因寒而凝結用熱藥以
祛寒自能解寒散毒也辟寒救腹丹白朮 三兩 茯
苓 三錢 肉桂 三錢 金銀花 三兩 附子 一錢 當歸 二
兩 蛇床子 五錢 水煎一服內消矣已潰者三劑膿
盡肉生四劑全愈此以白朮爲君者以其耑利腰
臍之氣也腰臍利則下部盡利矣後以蛇床銀花

祛毒氣易消又恐寒極不能直入故加附桂斬關而入惟是一派乾燥之味邪雖祛除未免耗血故用當歸陽中之陰少制其橫則陰寒漸散又無陽旺之患所以奏功也

米鑑

陳實功曰小腹癰生小腹漫腫堅硬肉色不變有熱漸紅者屬陽易治無熱不紅者屬陰難治此乃七情火鬱以致脾虛氣滯而成也

正宗

又曰初起七日以內者艾灸七壯膏蓋首尾內服壯脾胃養氣血行經補托之劑可保無虞如誤用尅

伐攻利涼藥敗症必出急用十全大補湯加參芪
薑附救之如補托不應者終久縱愈成漏

馮魯瞻曰腹癰者患於臍下或傍二寸許是屬脾經
若近脇者是屬膽經是症多因脾家陰虛氣凝血
滯傷脾所致 錦囊

胡公弼曰小腹癰又名丹毒癰乃飲食不調寒熱伏
結於腸胃成毒多生於小腹之側 青囊

百效全書云腹癰生於皮 七情火鬱以致
脾虛氣滯而成小兒乃驚積虧損而致但此證不

問初起已潰未潰宜壯胃氣而佐以行經活血之劑若誤用尅伐及下和寒涼則腫不能潰潰不能歛矣倘服下利降火破氣消瘀等藥急用大劑參芪薑附或十全大補湯救之如瘡勢漫腫堅硬肉色不變未有膿也四君子湯加川芎當歸白芷枳殼如焮腫痛甚隔蒜灸五七壯以殺其毒內用托裏之劑如腫起而軟色不赤者膿已成也膿成外不潰者卧針刺之以洩其毒不可直針以傷其膜內服托藥搽玉紅膏生肌收功

心法曰小腹癰由七情火鬱而生每發於氣海穴

在臍

下一寸五分

丹田穴

在臍下二寸

關元穴

在臍下三寸

皆屬任脉

經此三穴或一穴發腫卽爲小腹癰高腫紅活疼痛牽背易潰膿稠者易治若漫腫堅硬綿潰腐爛膿稀如水者爲疽難治

綬疽



瘍醫大全

卷三十 綬疽

重刊

顧氏秘書

緩疽門主論

王肯堂曰緩疽生小腹之左數月堅硬如石寒熱間作
飲食減少漸至尫羸屬足太陰經積熱所致準
心法曰緩疽乃脾經氣滯寒積而成生於小腹之傍
堅硬不紅不熱痛引腰腿數月不潰若兼食
少羸瘦者終屬敗證